

Professionnels, quand porter le masque?

20 mars 2020

MASQUE CHIRURGICAL

PERSONNELS:

- Personnel soignant en contact avec les patients;
 - Personnel administratif en contact avec les patients(accueil...);
 - Personnel intervenant dans les lieux de prise en charge des patients (prestataires de ménage, personnels des services techniques...);
 - Autre personnel présentant des signes d'infection respiratoire(toux, rhume, fièvre...), ou cas contact d'un cas COVID-19 ou personnel COVID-19 au retour de la période d'éviction ;
 - Personnel de laboratoire pour les manipulations qui exposent à un risque de projection de liquides biologiques.
- Deux (ou trois selon la durée de l'activité) masques chirurgicaux sont remis au personnel par le cadre du service lors de la prise de poste. Le masque est porté en continu, changé toutes les 4 heures.*

NB : Le masque doit être changé en cas d'exposition à une projection de gouttelettes.

PATIENTS LORS DES CONSULTATIONS, HDJ OU

DÉPLACEMENTS DANS L'HÔPITAL :

- présentant des signes d'infection respiratoire : toux, rhume, syndrome grippal, avec ou sans fièvre
- à risque de formes graves de COVID-19 même s'ils ne présentent pas de symptômes (patients fragiles, immunodéprimés, femmes enceintes, etc.)
- patient COVID-19 lorsqu'ils sortent de leur chambre.

MASQUE FFP2

- Personnel réalisant des manœuvres respiratoires à risque (exemple : intubation, VNI, Optiflow, aspiration trachéale, bronchoscopie, prélèvement naso-pharyngé...), ou des soins à risque chez un patient intubé (toilette, mobilisation, passage en décubitus ventral, ...) : pour des patients confirmés COVID-19 ou cas possibles, notamment ceux présentant une détresse respiratoire aiguë non expliquée;
- Personnel travaillant en contact d'un patient en précautions« Air » : tuberculose, rougeole, varicelle;
- Personnel de laboratoires selon recommandations en vigueur (laboratoires L3...).

>>> Bien vérifier l'étanchéité du masque : réaliser un fit-check

DANS TOUTES LES SITUATIONS:

- >>> Ne pas toucher le masque une fois en place.
- >>> Réaliser une FHA des mains avant la pose et après le retrait;
- >>> Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique, avant et après chaque contact avec un patient ;
- >>> Port de lunettes pour tout soin avec risque de projection oculaire de liquides biologiques ;
- >>> Port de gants pour tout risque de contact avec des liquides biologiques et FHA dès le retrait des gants.
- >>> Eviter tout rassemblement en ambiance confinée (pause café, transmissions...) : limiter le nombre de personnes, respecter une distance supérieure à 1 mètre.

NB: Conformément au MINSANTE N°2020-20 : les masques ayant une date de péremption dépassée peuvent être utilisés sous réserve de vérifier l'intégrité du conditionnement, la solidité de l'élastique et de la barrette nasale.